



а Вы прошли ФЛЮОРОГРАФИЮ

Заболеваемость туберкулезом и смертность от него в последние годы высоки.

Между тем, туберкулез полностью излечим, если он выявлен на ранней стадии.

Болезнь коварна!

Туберкулез начинается и протекает на первых этапах незаметно для больного. Нередко первые признаки туберкулеза напоминают симптомы простудных заболеваний, он «маскируется» под грипп или воспаление легких.

Заболеть туберкулезом может каждый!

- Наиболее уязвимые группы, среди которых туберкулез выявляется в 2-5 раз чаще, чем у остальных:
- люди, имеющие контакт с больными туберкулезом,
- лица, освободившиеся из мест лишения свободы,
- ВИЧ-инфицированные,
- потребители наркотиков,
- мигранты,
- пенсионеры,
- инвалиды,
- домохозяйки.

Самый объективный и быстрый способ выявления туберкулеза - флюорография.

Она практически безвредна для организма.

***Не отказывайтесь от флюорографии!
Позаботьтесь о своём здоровье!***



ЧТО ВЫ ДОЛЖНЫ ЗНАТЬ О ТУБЕРКУЛЕЗЕ

ПЕРВЫЕ ПРИЗНАКИ ТУБЕРКУЛЕЗА:

- Быстрая утомляемость и появление общей слабости.
- Снижение и/или отсутствие аппетита, потеря веса.
- Повышенная потливость, особенно под утро и в основном в верхней части туловища.
- Появление одышки при небольших физических нагрузках.
- Незначительное повышение температуры тела.
- Кашель или покашливание с выделением мокроты (возможно с кровью)
- Специфический блеск в глазах.

ТУБЕРКУЛЕЗ ЗАРАЗЕН И ОЧЕНЬ ОПАСЕН!

Возбудителем заболевания является микробактерия туберкулеза (она же - палочка Коха). ИСТОЧНИК - больной человек, который иногда даже не знает о своей болезни, так как туберкулез может протекать как обычная простуда, длительно не вылечивающаяся пневмония, а иногда бессимптомно, поэтому при туберкулезе особое значение имеют профилактика и раннее выявление.

РАЗВИТИЮ ТУБЕРКУЛЕЗА СПОСОБСТВУЮТ:

Факторы, ослабляющие защитные силы организма:

- переутомление, продолжительное чрезмерное волнение;
- неполноценное питание;
- хронические болезни - в первую очередь заболевания легких, сахарный диабет, язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки, ВИЧ и СПИД, злоупотребление алкоголем, наркотиками, табакокурением.

Входные ворота (путь проникновения инфекции):

чаще всего дыхательные пути, куда бациллы в огромном количестве проникают с капельками слюны и мокроты, которые выбрасываются больными при чихании, кашле. Заражение наступает при употреблении в пищу молочных продуктов от больных туберкулезом животных.

